

VIEŠOJI ĮSTAIGA JONIŠKIO LIGONINĖ
Pašvitinio g. 21, LT-84152 Joniškis

INFORMACINIS LAPAS APIE
GIMDOS KAKLELIO BIOPSIJĄ

BENDROJI INFORMACIJA

1. Jums įtariama gimdos kaklelio liga (patologija), todėl Jums siūlome atlikti gimdos kaklelio biopsiją.
2. Gimdos kaklelio biopsija atliekama:
 - a. patikslinti gimdos kaklelyje citologiniu tyrimu nustatytus pakitimus;
 - b. patikslinti kolposkopu matomiems pakitimams gimdos kaklelyje.
3. Biopsija - tai audinio gabalėlio paėmimas histologiniam ištyrimui. Šis tyrimas yra daug tikslesnis nei citologinis (tiriamos tik pavienės ląstelės), nes tiriami ląstelių sluoksniai (nustatomas pažeidimo gylis ir pobūdis).

PASEKMĖS IR PAVOJAI, ATSIŠAKIUS GIMDOS KAKLELIO BIOPSIJOS

4. Nustačius pakitimus gimdos kaklelio citologiniam tyrime ar matant pakitimus apžiūrint *ad oculus* (nenaudojant medicininės aparatūros) ar kolposkopu (optiniu prietaisu didinančiu vaizdą), būtinas pakitusių audinių histologinis tyrimas. Tik remiantis histologiniu tyrimu galima nustatyti diagnozę – patvirtinti įtariamus pakitimus, paneigti juos, ar diagnozuoti žymesnius nei įtariami pakitimai, o po to skirti Jums tinkamą gydymą ir/ar stebėjimą. Kraujavimas, žymūs pakitimai citologiniame gimdos kaklelio tyrime gali būti ir iki vėžinės ar onkologinės ligos simptomas, kurios laiku nedidžius (t.y. neatlikus histologinio tyrimo) ir dėl to neskyrus adekvataus gydymo - patologinis procesas gali progresuoti ir sukelti sunkius sveikatos sutrikimus, reikalauti ilgo ir sudėtingo gydymo.

GIMDOS KAKLELIO BIOPSIJOS ESMĖ, POBŪDIS, TIKSLAS

5. Aštriu instrumentu ar elektros kilpute paimami gimdos kaklelio audinio gabalėlis (-iai) iš įtartinų vietų.
6. Biopsijos tikslas - paimti ištyrimui gimdos kaklelio audinių gabalėlį (- ius) t.y. gauti medžiagą histologiniam tyrimui ir pagal gautus tyrimo rezultatus spręsti dėl tolimesnio gydymo.

GIMDOS KAKLELIO BIOPSIJOS EIGA

7. Gimdos kaklelio biopsija atliekama be nuskausminimo ar suleidus anestetiko į gimdos kaklelį. Moteris guldoma ant ginekologinės kėdės. Makštiniais skėtikliais išplečiama makštis, gimdos kaklelis fiksuojamas. Aštriu instrumentu (mažomis žnyplėmis) ar elektros kilpute paimamas gimdos kaklelio audinio gabalėlis (-iai) iš įtartinės vietos. Kraujavimas stabdomas koaguliuojant elektrokoagulatoriumi ar įdedant tamponą su specialiu medikamentu.
8. Pašalinti audiniai sudedami į indelius su fiksuojančiu skysčiu. Indeliai markiruojami (užrašoma procedūros data, pacientės pavardė, vardas, gimimo metai, iš kur paimta medžiaga). Paruošta medžiaga siunčiama histologiniam ištyrimui.

ALTERNATYVŪS DIAGNOSTIKOS METODAI

9. Gali būti atliekama ir didesnės apimties operacija – gimdos kaklelio konizacija. Jos metu pašalinamas ir vėliau ištiriamas visas priekinis gimdos kaklelio paviršius. Ši operacija yra daugiau intervencinė, ne visada būtina, nes daugeliu atvejų gali pakakti gimdos kaklelio biopsijos.

GALIMOS KOMPLIKACIJOS IR TOLESNĖS PASEKMĖS

10. Gimdos kaklelio biopsija yra įprastinė procedūra ir dažniausiai praeina be jokių komplikacijų. Operacijos eiga priklauso nuo esamų pakitimų, gimdos kaklelyje, kraujavimo iš gimdos kaklelio (biopsijos paėmimo vietoje) pobūdžio, gretutinių (kitų) pacientės susirgimų.
11. Dažniausia ir įprastai lengvai koreguojama komplikacija – kraujavimas iš biopsijos vietos – stabdomas koaguliuojant.
12. Ypač retai reikalingas stacionarinis gydymas kraujavimui stabdyti.
13. Jei esate alergiška ar padidintai jautri (vaistams, dezinfekcinėms priemonėms, lateksui, pleistrui ar pan.), gali pasitaikyti laikinas patinimas paraudimas, odos niežulys – kontakto su alergenu vietoje, ar kitos greitai praeinančios reakcijos. Sunkios alerginės reakcijos su gyvybinių funkcijų sutrikimu ir liekamaisiais reiškiniais yra labai retos.

REKOMENDACIJOS PO BIOPSIJOS ATLIKIMO

14. Atlikus gimdos kaklelio biopsiją, kelias dienas gali būti rusvų negausių išskyrių iš makšties, todėl reikėtų vartoti higieninius įklotus.
15. 3 savaites po gimdos kaklelio biopsijos atlikimo rekomenduojama nesimaudyti karštoje vonioje, baseinuose, gamtiniuose vandens telkiniuose, pirtyse, o taip pat vengti sunkaus fizinio krūvio, intymių santykių. Nerekomenduojama vykti į tolimes keliones.
16. Po 7-10 dienų po gimdos kaklelio biopsijos atlikimo skiriama pakartotinė gydytojo akušerio ginekologo konsultacija: aptarti gimdos kaklelio biopsijos histologinio tyrimo rezultatus ir pacientei paskirti adekvačią sveikatos priežiūrą.