

VIEŠOJI ĮSTAIGA JONIŠKIO LIGONINĖ  
Pašvitinio g. 21, LT-84152 Joniškis

INFORMACINIS LAPAS APIE  
DIAGNOSTINĘ GIMDOS GLEIVINĖS ASPIRACIJĄ  
(DALIES GIMDOS GLEIVINĖS PAĖMIMAS TYRIMUI)

BENDROJI INFORMACIJA

1. Jums įtariama gimdos gleivinės liga, todėl Jums siūlome diagnostinę procedūrą - diagnostinę gimdos gleivinės aspiraciją (dalies gimdos gleivinės paėmimą tyrimui). Gauta gimdos gleivinė ištiriama gydytojo patologo (atliekamas histologinis tyrimas) ir, kai yra nustatoma tiksli gimdos gleivinės pakitimų kilmė, galima skirti Jums adekvatų gydymą.

LIGOS PASEKMĖS IR PAVOJAI, ATSIŠAKIUS DIAGNOSTINĖS GIMDOS GLEIVINĖS  
ASPIRACIJOS

2. Diagnozavus gimdos gleivinės ligą vaizdiniais metodais (tiriant echoskopu, kompiuterine tomografija, magnetiniu rezonansu ir kt.) ar esant nenustatytos kilmės kraujavimams iš gimdos, yra būtinas histologinis gimdos gleivinės tyrimas. Tik remiantis histologinio tyrimo rezultatais galima skirti Jums adekvatų gydymą. Patologinis kraujavimas iš gimdos gali būti ir onkologinės ligos simptomas, o šios ligos laiku nediagnozavus, galimi sunkūs sveikatos sutrikimai, kurių gydymas yra ilgas ir sudėtingas procesas, gali atsirasti reali grėsmė ir Jūsų gyvybei.

DIAGNOSTINĖS GIMDOS GLEIVINĖS ASPIRACIJOS ESMĖ,  
POBŪDIS, TIKSLAS

3. Diagnostinės gimdos gleivinės aspiracijos tikslas paimti dalį gimdos gleivinės ištyrimui, t.y. medžiagą histologiniam tyrimui.

DIAGNOSTINĖS GIMDOS GLEIVINĖS ASPIRACIJOS EIGA

4. Moteris guldoma ant ginekologinės kėdės. Makštiniais skėtikliais išplečiama makštis, apžiūrimas ir specialiu instrumentu fiksuojamas gimdos kaklelis. Diagnostinė gimdos gleivinės aspiracija dažniausiai atliekama su trumpalaikiu vietiniu nuskausminimu (į gimdos kaklelio audinius švirkštu suleidžiama anestetiko). Vėliau zonu patikrinamas gimdos gylis. Į gimdos ertmę įkišamas vakuuminio aspiratoriaus antgalis (sterilus, plonas, plastikinis vamzdelis su angutėmis). Sudarius vakuumą ir atliekant judesius palei gimdos sieneles, iš gimdos išsiurbiamas dalis gleivinės. Gauti audiniai sudedami į indelius su fiksuojančiu skysčiu. Indeliai markiruojami (užrašoma procedūros data, pacientės pavardė, vardas, gimimo metai, iš kur paimta medžiaga). Paruošta medžiaga siunčiama histologiniam ištyrimui.

ALTERNATYVŪS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO METODAI

5. Gimdos gleivinę ištirti galima:
  - a. atliekant gimdos gleivinės abraziją;
  - b. histeroskopiją,

- c. gimdos pašalinimo operaciją.
6. Visos šios operacijos atliekamos bendrinėje nejautroje, o gauta operacijos metu medžiaga atiduodama histologiniam ištyrimui. Minėti gimdos gleivinės ištyrimo metodai yra labiau invazyvūs ir radikalūs, jie taikomi priklausomai nuo patologijos pobūdžio. Dažniausiai jie taikomi kaip gydymo metodai (ypatingai histeroskopija ir gimdos pašalinimo operacija), jų metu pašalinti audiniai ir/ar organai ištiriami histologiškai.

#### GALIMOS KOMPLIKACIJOS IR TOLESNĖS PASEKMĖS

7. Gimdos gleivinės aspiracija yra įprastinė procedūra ir dažniausiai praeina be jokių komplikacijų. Diagnostinės gimdos gleivinės aspiracijos eiga priklauso nuo esamų pakitimų, gimdos kaklelio būklės, kraujavimo pobūdžio, gimdos padėties, formos, gretutinių pacientės susirgimų (krešėjimo sutrikimų, dubens kaulų patologijos ir t.t.).
8. Diagnostinės gimdos gleivinės aspiracijos metu labai retai galimas gimdos sienelės pradūrimas instrumentu, dėl ko gali prasidėti kraujavimas į pilvo ertmę. Diagnozavus šią būklę, atliekama atvira operacija, kai prapjovus pilvo sienelę, susiuvamas gimdos sienelės defektas.
9. Jei esate alergiška ar padidintai jautri (vaistams, dezinfekcinėms priemonėms, lateksui, pleistru ar pan.), gali pasitaikyti laikinas patinimas paraudimas, odos niežulys - kontakto su alergenu vietose, ar kitos greitai praeinančios reakcijos. Sunkios alerginės reakcijos su gyvybinių funkcijų sutrikimu ir liekamaisiais reiškiniais yra labai retos.
10. Kartais dėl anatominių ypatumų, ar moters didelio jautrumo skausmui – procedūros atlikti nepavyksta, tokiu atveju siūloma procedūrą atlikti stacionare taikant bendrąją nejautrą.

#### REKOMENDACIJOS, ATLIKUS DIAGNOSTINĘ GIMDOS GLEIVINĖS ASPIRACIJĄ

11. Atlikus diagnostinę gimdos gleivinės aspiraciją, dar keletą dienų gali būti negausių kraujingų išskyrų iš gimdos, todėl rekomenduojama naudoti higieninius įklotus.
12. Atlikus diagnostinę gimdos gleivinės aspiraciją, dar kelias dienas galite jausti maudimą pilvo apačioje. Šiems simptomams malšinti tinka įprastiniai nuskausminantys preparatai, kuriuos Jums rekomenduosime.
13. Esant neaiškumui dėl pakitusių išskyrų iš makšties, skausmo, karščiavimo kreipkitės į savo šeimos gydytoją.
14. Po 7-10 dienų po diagnostinės gimdos gleivinės aspiracijos atlikimo būtina atvykti pakartotinai gydytojo akušerio ginekologo konsultacijai – aptarti gimdos gleivinės histologinio tyrimo rezultatus ir skirti Jums tinkamą gydymą.