

VIEŠOJI ĮSTAIGA JONIŠKIO LIGONINĖ
Pašvitinio g. 21, LT-84152 Joniškis

INFORMACINIS LAPAS APIE
HIDROCELĖS PUNKCIJOS PROCEDŪRĄ

BENDROJI INFORMACIJA

1. Jums diagnozuota hidrocelė. Hidrocelė (sėklidės vandenė) - tai skysčio susirinkimas apie sėklidę esančiuose dangaluose, kas sukelia mašnelės (kapšelio) apimties padidėjimą, gali atsirasti maudimo jausmas, skausmas mašnelės (kapšelio) srityje.
2. Hidrocelės priežastys gali būti: buvusi sėklidžių trauma, infekcinės ir neinfekcinės kilmės sėklidės dangalų uždegimai, buvusios sėklidžių operacijos.

LIGOS PASEKMĖS IR PAVOJAI, ATSIŠAKIUS PROCEDŪROS

3. Paprastai hidrocelė, kuri nedidėja, yra nedidelė ir nesukelia simptomų (skausmingumo, tempimo jausmo), nereikalauja gydymo, tačiau bet koku atveju reikalinga urologo konsultacija, kad būtų ekskliuduotas (atmestas) infekcinės ar navikinės kilmės mašnelės (kapšelio) apimties padidėjimas bei kitos terapinės ligos (širdies nepakankamumas, hipoproteinemijos ir pan.).

PROCEDŪROS ESMĖ, POBŪDIS, TIKSLAS

4. Hidrocelės punkcija atliekama vietinėje nejautroje. Punkcijos metu ištraukiamas hidrocelės maišo skystis. Procedūros pabaigoje gali būti suleidžiama medžiagų, kurios sąlygoja dangalų sulipimą, kas sumažina skysčio produkciją. Procedūrą galima kartoti. Dažnai po šios procedūros 6 mėn. laikotarpiu sėklidės vandenė atsinaujina. Pakartotinos hidrocelių punkcijos susijusios su didesne infekcinių komplikacijų rizika.

ALTERNATYVŪS GYDYMO METODAI

5. Alternatyva hidrocelės punkcijai yra chirurginis hidrocelės gydymas. Chirurginis gydymas rekomenduojamas, kai po punkcijos, sėklidės vandenė atsinaujina. Chirurginis gydymas – efektyvesnis, bet dėl didesnės invazijos yra didesnė ir komplikacijų tikimybė.

GALIMOS KOMPLIKACIJOS IR TOLESNĖS PASEKMĖS

6. Po kiekvienos intervencinės gydomosios procedūros, net ir kokybiškai atliktos, gerai ligonį slaugant, galimos komplikacijos.
7. Po šios procedūros labai dažnai būna mašnelės (kapšelio) patinimas, kuris praeina maždaug per 1 mėnesį.
8. Aplink žaizdą gali susidaryti hematoma (mėlynė), kuri greitai praeina.
9. Galimas žaizdos supūliavimas, infekcijos išplitimas. Pakartotinos hidrocelių punkcijos susijusios su didesne infekcinių komplikacijų rizika.
10. Esant alergijai ar jautrumui (pvz. medikamentams, dezinfekcinėms priemonėms, lateksui, pleistru), gali pasitaikyti laikinas patinimas, paraudimas, odos niežulys, ar kitos greitai praeinančios reakcijos. Sunkios alerginės reakcijos su gyvybinių funkcijų sutrikimu ir liekamaisiais reiškiniais yra labai retos.
11. Operacijos metu ar pooperaciniu periodu gali kilti ir kitos komplikacijos, tačiau jų tikimybė yra labai maža.
12. Dažnai po šios procedūros sėklidės vandenė atsinaujina.

REKOMENDACIJOS PO PROCEDŪROS

13. Po procedūros pacientui yra būtina gydytojo nustatytą terminą vartoti paskirtus medikamentus. Antibiotikų profilaktika apie 3-4% pacientų neapsaugo nuo infekcinių komplikacijų.
14. Esant neaiškumų dėl gydytos srities gijimo ($T \geq 38^\circ$, paraudimas, patinimas, tirpimas, skausmas ir pan.), informuokite šeimos gydytoją.