

VIEŠOJI ĮSTAIGA JONIŠKIO LIGONINĖ
Pašvitinio g. 21, LT-84152 Joniškis

INFORMACINIS LAPAS APIE
KAULŲ REPOZICIJĄ (ATSATYMĄ)

BENDROJI INFORMACIJA

1. Jums reikalinga kaulų repozicija dėl išnirimo/lūžio.
2. Kaulų repozicija atliekama siekiant uždarai atstatyti sąnarių ar lūžusių kaulų vientisumą.

LIGOS PASEKMĖS IR PAVOJAI, ATSIŠAKIUS PROCEDŪROS

3. Neatlikus kaulų repozicijos lūžio atveju, kaulai sugyja su poslinkiu, kas pasekoje gali sukelti ženklų funkcijos sutrikimą,
4. Neatlikus kaulų repozicijos esant išnirimui, lieka deformuotas sąnarys, neatstatytas sąnarių paviršių kongruentiškumas (nesutampa sąnariniai paviršiai). Dėl nereponuotų kaulų, visiškai sutrinka sąnario funkcija, ko pasekoje vystosi kontraktūra - sąnario nejudrumas.

PROCEDŪROS ESMĖ, POBŪDIS, TIKSLAS

5. Prieš atliekant procedūrą, atliekami diagnostiniai radiologiniai tyrimai (rentgenogramos, kompiuterinė tomografija)
6. Repozicija atliekama vietinėje arba intraveninėje nejautroje.
7. Procedūros metu specialių manipuliacijų pagalba atstatomas kaulų ar sąnarių vientisumas.
8. Po procedūros galūnė imobilizuojama gipso longete ar įtvaru. Atliekamos kontrolinės rentgenogramos.

ALTERNATYVŪS GYDYMO METODAI

9. Alternatyvių gydymo metodų nėra. Neatlikus repozicijos, vėliau išsivysto sąnario kontraktūra ar kaulas sugyja su poslinkiu. Todėl tenka atlikti operaciją – atvirą repoziciją. Tai yra susiję su ilgesniu gydymosi periodu ir sunkesnėmis komplikacijomis.

GALIMOS KOMPLIKACIJOS IR TOLESNĖS PASEKMĖS

10. Po kiekvienos medicininės procedūros, net ir kokybiškai atliktos, yra galimos komplikacijos. Šių procedūrų komplikacijos yra retos ir nesunkios.
11. Po repozicijos gali būti šios retai pasitaikančios komplikacijos:
 - a. galūnės tirpimas ar jutimo sutrikimas (nervų pažeidimas),
 - b. kaulo sugijimas su poslinkiu;
 - c. sąnario ertmės infekavimas (atliekant vietinį nuskausminimą).
12. Labai reta komplikacija – kraujavimas, kuris paprastai būna pacientams turintiems krešumo sutrikimų.

13. Esant alergijai ar jautrumui (pvz. medikamentams, dezinfekcinėms priemonėms, lateksui, pleistrui), gali pasitaikyti laikinas patinimas, paraudimas, odos niežulys, ar kitos greitai praeinančios reakcijos. Sunkios alerginės reakcijos su gyvybinių funkcijų sutrikimu ir liekamaisiais reiškiniais yra labai retos.
14. Procedūros metu ar po procedūros gali kilti ir kitos komplikacijos, tačiau jų tikimybė yra labai maža.

REKOMENDACIJOS PO PROCEDŪROS

15. Po procedūros pacientui yra būtina gydytojo nustatytą terminą vartoti paskirtus vaistus. Antibiotikų profilaktika apie 3-4% pacientų neapsaugo nuo infekcinių komplikacijų, t.y. žaizdos supūliavimo.
16. Po procedūros pacientui yra būtina laikytis režimo, jei gydytojo yra nurodyta, nešioti imobilizuojantį įtvarą, riboti fizinį aktyvumą gydytojo nustatytą laiką, nurodytu laiku atvykti pas gydytoją.
17. Esant neaiškumų dėl reponuotų kaulų srities gijimo ($T \geq 38^\circ$, paraudimas, patinimas, tirpimas, skausmas ir pan.), informuokite šeimos gydytoją.