

VIEŠOJI ĮSTAIGA JONIŠKIO LIGONINĖ
Pašvitinio g. 21, LT-84152 Joniškis

INFORMACINIS LAPAS APIE
AMBULATORINĘ NEKREKTOMIJOS OPERACIJĄ

BENDROJI INFORMACIJA

1. Jums reikia iš žaizdos pašalinti nekrozinės mases (mirusius audinius). Nedidelės, negilios žaizdos gali būti valomos ambulatorinėmis sąlygomis.

LIGOS PASEKMĖS IR PAVOJAI, ATSIŠAKIUS OPERACIJOS

2. Nepašalinus nekrozių masių iš žaizdos ženkliai sulėtėja žaizdos gijimas, nes žaizdoje padengtoje negyvais audiniais lėčiau arba visiškai nevyksta gijimo procesai.
3. Nepašalinus nekrozių masių iš žaizdos yra didelis infekcijos pavojus, nes audinių irimo produktai yra toksiški ir patekę į kraujotaką sukelia karščiavimą, bei neigiamai veikia vidaus organų veiklą. Infekcijai progresuojant gali išsivystyti kraujo užkrėtimas – sepsis. Šios komplikacijos yra pavojingos gyvybei.

OPERACIJOS ESMĖ, POBŪDIS, TIKSLAS

4. Operacija atliekama vietinėje nejautroje. Jei žaizda nedidelė, operacija gali būti atliekama ir be nuskausminimo. Nekrektomijos metu iš žaizdos pašalinami negyvi audiniai, žaizda išvaloma, paruošiama tolimesniam gijimo procesui.

GALIMOS KOMPLIKACIJOS IR TOLESNĖS PASEKMĖS

5. Nekrektomijos nėra dažna operacija, tačiau dažniausiai praeina be komplikacijų. Operacijos eiga priklauso nuo esamų pakitimų, negyvybingų audinių plotų, laiko praėjusio nuo traumos, kraujagyslių sužalojimo. Nepalankiais atvejais, net ir atidžiai operuojant neišvengiama aplinkinių audinių sužalojimo.
6. Kitos sunkios komplikacijos: kraujagyslių ar nervų pažeidimas, didesnis kraujo netekimas būna retai.
7. Vėlesnės komplikacijos: žaizdos infekcija, kraujavimas iš operacinės žaizdos būna gana retai.
8. Odos ir minkštųjų audinių pažeidimai dėl elektros prietaisų naudojimo, karščio ir/ar dezinfekcijos priemonių yra reti ir pagyja savaime.
9. Apie antibiotikų vartojimą nuspręsimė atskirai įvertinę Jūsų infekcinę riziką.
10. Kartais pasitaiko randų hipertrofija, išsiplėtimas. Odos jutimų sutrikimas randų srityje kartais išlieka visam laikui.
11. Esant alergijai ar jautrumui (pvz. vaistams, dezinfekcinėms priemonėms, lateksui, pleistrui), gali pasitaikyti laikinas patinimas, paraudimas, odos niežulys, ar kitos greitai praeinančios reakcijos. Sunkios alerginės reakcijos su gyvybinių funkcijų sutrikimu ir liekamaisiais reiškiniais yra labai retos.
12. Operacijos metu ar pooperaciniu periodu gali kilti ir kitos komplikacijos, tačiau jų tikimybė yra labai maža.

POOPERACINĖS REKOMENDACIJOS

13. Po operacijos pacientui yra būtina gydytojo nustatytą terminą vartoti paskirtus vaistus. Antibiotikų profilaktika apie 3-4% pacientų neapsaugo nuo infekcinių komplikacijų, kurių dažniausios yra žaizdų supūliavimas.