

VIEŠOJI ĮSTAIGA JONIŠKIO LIGONINĖ
Pašvitinio g. 21, LT-84152 Joniškis

INFORMACINIS LAPAS APIE
RYKLĖS PŪLINIO GYDYMĄ

BENDROJI INFORMACIJA

1. Ryklės pūlinys (abscesas) yra viena iš galimų tonzilito (anginos) komplikacijų. Sergant tonzilitu, bakterinis uždegimas gali plisti arba lokalizuotis. Jei pūliai susikaupia aplink tonziles esančiuose audiniuose, pūlinys vadinamas paratonziliiniu abscesu, jei pūliai išplinta giliau į ryklę, kaklą, vadinamas retrofaringiniu abscesu, kurio gydymas yra daug sudėtingesnis. Ryklės pūliniai taip pat gali formuotis ir iš supūliavusių limfinių mazgų, bei susidaryti esant dantų patologijai ir kt.
2. Ryklės pūlinys yra pavojinga liga, kadangi plisdamas pūlinys gali užspausti kvėpavimo takus ir sukelti rimtą pavojų gyvybei.

GYDYMO BŪDAI

3. Ryklės pūlinio gydymui taikomos invazinės procedūros – punkcija (turinio aspiracija adata), incizija (pūlinio atvėrimas) arba operacija – abscestonzilektomija (pūlinio pašalinimas kartu su tonzile).
4. Pūlinio punkcija. Tai gali būti ir kaip diagnostinis metodas, ir gydymo procedūra. Atliekama ambulatoriškai. Nuskausminus vietiškai (ryklė supurškama nuskausminamaisiais aerozoliais) durinama su specialia punkcine adata į pūlinį ir tokiu būdu ištraukiami pūliai. Skiriama antibiotikų, vaistų nuo skausmo. Jei nepakanka šios procedūros, jei pūliai pasišalino nepilnai ar abscesas išplitęs, atliekamas pūlinio atvėrimas.
5. Pūlinio atvėrimas. Vietinėje neįtaroje, supurškus ir suleidus vaistų nuo skausmo, skalpeliu prapjaunamas pūlinys, išsiurbiami arba išvalomi pūliai, pūlinio ertmė praplaunama antibiotikais, jei reikia, paliekamas drenas, kad galėtų pūliai patys ištekėti. Skiriami antibiotikai, priešuždegiminiai vaistai. Gydytojui nusprendus, procedūra gali būti kartojama.
6. Kitais atvejais, jei dažnai kartojasi pūlingos anginos ir kartojasi pūliniai, kai yra sunki bendra ligonio būklė ir įtariamas pūlinio plitimas, atliekama operacija – abscestonzilektomija. Ši operacija atliekama stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje, dažniausiai bendrinėje neįtaroje. Operacijos metu pašalinama gomurinė tonzilė kartu su pūliniu.

GALIMOS KOMPLIKACIJOS ATSIŠAKIUS GYDYMO

7. Pavojingos tonzilito sukulto ryklės pūlinio komplikacijos – infekcijos patekimas į kraujo tėkmę (sepsis), pūlių išplitimas į krūtinės ląstą (mediastinitas – labai pavojinga būklė). Bakterijos, kurios sukelia tonzilitus, gali sąlygoti rimtus širdies, inkstų ir sąnarių pažeidimus.

GYDYMO KOMPLIKACIJOS

8. Dažniausiai pasitaikanti komplikacija yra kraujavimas ir krešulių susidarymas. Galimos ir kitos, retesnės komplikacijos kaip liežuvio ir minkštojo gomurio edema, viršutinių kvėpavimo takų obstrukcija, sepsis, kraujagyslių trombozė, rijimo ir ar kalbos sutrikimai, dantų pažeidimas, randai ryklėje, gerklų stenoze ir ar edema, gerklų spazmas, užkimimas, užspringimas, labai retais atvejais – mirtis.

TOLIMESNĖS REKOMENDACIJOS

9. Po procedūros reikia laikytis režimo - savaitę riboti fizinį krūvį, nevalgyti karšto, aštraus, grubaus maisto, vartoti gausiai skysčių, gerti nuskausminamuosius vaistus ir tęsti paskirtą gydymą.